

HUMEDBIO

Hipromelosa 0,3 %

Solución Oftálmica

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Hipromelosa 3,0 mg

Excipientes: Fosfato de sodio monobásico anhidro, Fosfato de sodio dibásico anhidro, Cloruro de potasio, Edetato disódico, Perborato de sodio tetrahidratado, Ácido Dietilentriaminopentametilfosfónico Sal heptasódica. c.s.p.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

La hipromelosa se utiliza como lágrimas artificiales para prevenir el daño a la córnea en pacientes con queratoconjuntivitis seca acompañada de artritis reumatoide, o queratitis o durante procedimientos de gonioscopia. También se utiliza para humedecer lentes de contacto duros y lubricar ojos artificiales.

La hipromelosa brinda un alivio inmediato a las condiciones de ojo seco (incluyendo condiciones de ojo seco asociado al uso de consolas de visualización y televisión, parpadeo poco frecuente, algunos tratamientos médicos, contaminación atmosférica y ambientes secos por ejemplo aire acondicionado, calefacción central, viento y sol).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes.

PROPIEDADES FARMACOLOGICAS

Propiedades Farmacodinámicas:

La hipromelosa es una solución emoliente de alivio con propiedades y usos similares a los de la metilcelulosa. Sus ventajas sobre la metilcelulosa son que los mucílagos de la hipromelosa tienen mayor claridad y se presentan usualmente menos fibras no dispersas. Prolonga la acción de gotas oftálmicas medicadas y se utiliza como lágrimas artificiales para prevenir el daño a la córnea en los síndromes de ojo seco.

Propiedades Farmacocinéticas

No aplica para preparaciones (oftálmicas) tópicas. La hipromelosa no se absorbe sistémicamente.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La hipromelosa prolonga el tiempo de contacto de medicamentos aplicados tópicamente comúnmente utilizados en oftalmología.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA SU USO:

Para ayudar a preservar la esterilidad del producto, el gotero no debe tocar los párpados ni otra superficie.

INCOMPATIBILIDADES: No se reportan

REACCIONES ADVERSAS:

Se han reportado las siguientes reacciones adversas. No se puede estimar la frecuencia con los datos disponibles.

Trastornos oculares: visión borrosa, dolor ocular, sensación de cuerpo extraño en los ojos, irritación ocular, e hiperemia ocular.

Se debe advertir a los pacientes que si desarrollan cualquier otro malestar o posible reacción adversa que no estuviera descrita pedir consejo con su médico o farmacéutico inmediatamente para saber si pueden continuar con el tratamiento de HUMEDBIO 0,3% Solución Oftálmica.

EMBARAZO Y LACTANCIA

No se ha establecido la seguridad en su uso durante el embarazo y lactancia. Por lo tanto, solo use cuando sea considerado esencial por el médico.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y USAR MAQUINARIA

Puede causar visión borrosa temporal al instilar. No maneje ni opere maquinaria peligrosa hasta que la visión sea clara.

SOBREDOSIS

No aplica para preparaciones (oftálmicas) tópicas. La hipromelosa no se absorbe sistémicamente.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: Oftálmica

La dosis recomendada para adultos, niños y bebés de todas las edades es una o dos gotas instiladas tópicamente en el ojo tres veces al día según se necesite, o según la indicación del médico.

PERÍODO DE VALIDEZ:

3 Años. No debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

Cerrar el frasco inmediatamente después de usarlo. Una vez abierto utilizarlo máximo 30 días. Conserve en posición vertical. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacénese a temperatura no mayor de 30°C. Mantener frasco herméticamente cerrado.